
Largeur du produit cartésien d'ordinaux

Isa Vialard

Motivation

- WQO → WSTS (Machine à compteurs, VASS)
 - → Vérification de programmes
- Mesure → Complexité



Invariants ordinaux

suites décroissantes = Hauteur
Arbre des mauvaises suites = Maximal order type antichaines = Largeur

Invariants ordinaux

suites décroissantes = Hauteur

Arbre des mauvaises suites = Maximal order type

antichaines = Largeur

Intuition par jeu




État de l'art

Table 1: Ordinal invariants of the main WQOs.

P	o(P)	h(P)	w(P)
α ordinal	α	α	1 (or 0)
A_n (size n antichain)	n	1	n
№³	ω^2	ω	ω
$\sum_{i \in \alpha} P_i$	$\sum_{i \in \alpha} o(P_i)$	$\sum_{i \in \alpha} h(P_i)$	$\sup_{i \in \alpha} w(P_i)$
$P \sqcup Q$	$o(P) \oplus o(Q)$	$\max(h(P), h(Q))$	$w(P) \oplus w(Q)$
$P \cdot Q$	$o(P) \cdot o(Q)$	$h(P) \cdot h(Q)$	$w(P) \odot w(Q)$
$P \times Q$	$o(P) \otimes o(Q)$	h(P) + h(Q)	?
M(P)	$\omega^{\widehat{o(P)}}$	$h^*(P)$?
$P^{<\omega}$	$\omega^{\omega^{o(P)\pm 1}}$	$h^*(P)$	$o(P^{<\omega})$
T(P)	$\vartheta(\Omega^{\omega} \cdot o(P))$	$h^*(P)$	o(T(P))


Produit cartésien de 2 ordinaux



 Uri Abraham, 1987, A note on Dilworth theorem in the infinite case

$$\boldsymbol{w}(\omega\alpha\times\omega\beta) = \omega\omega^{\alpha'\oplus\beta'}\cdot(a+b-1) + [\boldsymbol{w}(\omega\omega^{\alpha'}\times\omega\sigma)\oplus\boldsymbol{w}(\omega\omega^{\beta'}\times\omega\rho)] \ .$$

Produit de 3 ordinaux?




Produit cartésien de *n* ordinaux

 On décompose un produit d'ordinaux X en tranches X_s.

Théorème

$$w(X) = \bigoplus_{s \in Gr(X)} w(X_s)$$
.



Application

Une condition suffisante pour o(X)=w(X)

Théorème.

Soit $X = X_1 \times \cdots \times X_n$. S'il existe $i \neq j$ tels que $\mathbf{o}(X_i)$, $\mathbf{o}(X_j)$ sont de la forme ω^{α} , ω^{β} avec α , β infinis, alors $\mathbf{w}(X) = \mathbf{o}(X)$.

Preuve:

$$w(o(X_1) \times \cdots \times o(X_n)) \leq w(X) \leq o(X)$$

Wqos élémentaires

 $A, B := \emptyset \mid A \sqcup B \mid A \times B \mid A^* \mid M^{\diamond}(A) \mid (coming \ soon \ P_f(A))$

X	o(X)	$\boldsymbol{h}(X)$	$\boldsymbol{w}(X)$
$A \sqcup B$	$o(A) \oplus o(B)$	$\max(\boldsymbol{h}(A), \boldsymbol{h}(B))$	${m w}(A) \oplus {m w}(B)$
$A\times B$	$o(A) \otimes o(B)$	$\boldsymbol{h}(A) + \boldsymbol{h}(B)$	New!
$M^{\diamond}(A)$	$\widehat{\omega^{o(A)}}$	$m{h}^*(A)$	$\begin{cases} \boldsymbol{o}(M^{\diamond}(A)) \text{ if } \boldsymbol{o}(A) \text{ is infinite,} \\ \omega^{k-1} \text{ if } \boldsymbol{o}(A) = k \\ \begin{cases} \boldsymbol{o}(A^*) \text{ if } \boldsymbol{o}(A) > 1 \\ \text{else } 1 \end{cases}$
A^*	$\omega^{\omega^{o(X)\pm 1}}$	$\boldsymbol{h}^*(A)$	$\begin{cases} \boldsymbol{o}(A^*) & \text{if } \boldsymbol{o}(A) > 1 \\ \text{else } 1 \end{cases}$

Conclusion